

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten					Alter in Jahren						
		6	2	3	4	11–14	15–23	2–4	5–6	9–14	15–16	17	ab 18
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	N	A1		A2		N	A (ggf. N) <sup>e</sup>
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	N	A1		A2		N	A (ggf. N) <sup>e</sup>
Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	N	A1		A2		N	A (ggf. N) <sup>e</sup>
Hib <i>H. influenzae</i> Typ b		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N	N						
Poliomyelitis		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N	N		A1		N		ggf. N
Hepatitis B		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N				N			
Pneumokokken <sup>a</sup>		G1		G2	G3	N							S <sup>g</sup>
Rotaviren	G1 <sup>b</sup>	G2	(G3)										
Meningokokken C			G1 (ab 12 Monaten)							N			
Masern				G1	G2					N		S <sup>f</sup>	
Mumps, Röteln				G1	G2					N			
Varizellen				G1	G2					N			
Influenza													S (jährlich)
HPV Humane Papillomviren								G1 <sup>d</sup>	G2 <sup>d</sup>	N <sup>d</sup>			

## Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teiliimpfungen G1–G4)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

N Nachholimpfung

(Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

a Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.

b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.

c Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.

d Standardimpfung für Mädchen **und Jungen** im Alter von 9–14 Jahren mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten; bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).

e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen  $\geq 18$  Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.

g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.