


Tabelle 1 | Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2021

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten									Alter in Jahren										
		6	2	3	4	5–10	11 ^a *	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60		
		U4			U5			U6			U7			U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J2			
Rotaviren		G1 ^a		G2	(G3)																
Tetanus ^b			G1		G2			G3 ^c						A1		A2				A ^e	
Diphtherie ^b			G1		G2			G3 ^c						A1		A2				A ^e	
Pertussis ^b			G1		G2			G3 ^c						A1		A2			A3 ^e		
Hib ^b – <i>H. influenzae</i> Typ b			G1		G2			G3 ^c													
Poliomyelitis ^b			G1		G2			G3 ^c							A1						
Hepatitis B ^b			G1		G2			G3 ^c													
Pneumokokken ^b			G1		G2			G3 ^c													S ^g
Meningokokken C									G1												
Masern								G1				G2								S ^f	
Mumps, Röteln								G1				G2									
Varizellen								G1				G2									
HPV – Humane Papillomviren														G1 ^d	G2 ^d						
Herpes zoster																				G1 ^h	G2 ^h
Influenza																					S (jährlich)

 Empfohlener Impfzeitpunkt

 Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen

- G Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)
- A Auffrischung
- S Standardimpfung

- a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
- b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen
- c Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate
- d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich
- e Td-Auffrischung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
- f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
- g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff
- h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
- * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden