

2020-10-07 Quellen „Mandel-Op“

Quellen:

Bublak R. Tonsillektomie: Anzeichen einer Infektion erhöhten das Blutungsrisiko. Springermedizin.de, 07.08.2020.

Johnston J, Vergeer A, Donaldson N, Shetty S, Mahadevan M. Our experience of the increased rates of post tonsillectomy haemorrhage in 1538 children with pre-operative infective symptoms or signs. Clin Otolaryngol, First published: 27 July 2020.

<https://doi.org/10.1111/coa.13610>

Kim, S.J., Walsh, J., Tunkel, D.E., Boss, E.F., Ryan, M. and Lee, A.H. (2020), Frequency of post-tonsillectomy hemorrhage relative to time of day. The Laryngoscope 2020;130 (7), 1823-1827

<https://doi.org/10.1002/lary.28302>

Kraus D. Die Erfahrung vieler HNO-Ärzte spricht dafür, dass Nachblutungen nach Tonsillektomie bevorzugt nachts auftreten. Und sie liegen offenbar nicht falsch damit. Springermedizin.de, 17.10.2019.

Windfuhr J P. Tonsillektomie und Tonsillotomie. HNO 2020; 68, 543-552.

<https://doi.org/10.1007/s00106-020-00884-3>