

Impfkalender 2018/2019 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2018



impfen-info.de

Wissen, was schützt.



Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)



Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)



Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	6 Wochen	2 Monate	U4 3 Monate	4 Monate	U6 11–14 Monate	U7 15–23 Monate	2–4 Jahre	U9 5–6 Jahre	J1 9–14 Jahre	15–16 Jahre	17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Tetanus >		G1	G2	G3	G4	N	→	A1	A2		N	A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie >		G1	G2	G3	G4	N	→	A1	A2		N	A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis) >		G1	G2	G3	G4	N	→	A1	A2		N	A ^d	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b) >		G1	G2	G3	G4	N	→						
Kinderlähmung (Poliomyelitis) >		G1	G2	G3	G4	N	→		A		N	ggf. N	→
Hepatitis B >		G1	G2	G3	G4	N	→						
Pneumokokken >		G1 ^b		G2	G3	N							S ^f
Rotaviren >	G1 ^a	G2	(G3)										
Meningokokken C >					G (ab 12 Monaten)		N	→					
Masern >					G1	G2	N	→				S ^e	
Mumps >					3-fach- Impfung MMR	3-fach- Impfung MMR + Windpocken	N	→					
Röteln >					3-fach- Impfung MMR	3-fach- Impfung MMR + Windpocken	N	→					
Windpocken (Varizellen) >					G1	G2	N	→					
HPV (Humane Papillomviren) >									G1+G2 ^c	N ^c	→		
Grippe (Influenza)													S (jährlich)
Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere													S (jährlich)

- U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder
G Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1–G4)
S Standardimpfung
J Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
N Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
A Auffrischimpfung

- a** die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
c 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 - 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter > 14 Jahre sind 3 Impfungen erforderlich

- d** einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis
e Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit
f Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff