

Impfkalender 2019/2020 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2019



impfen-info.de

Wissen, was schützt.



Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)



Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)



Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	6 Wochen	2 Monate	U4 3 Monate	4 Monate	U6 11–14 Monate	U7 15–23 Monate	2–4 Jahre	U9 5–6 Jahre	J1 9–14 Jahre	15–16 Jahre	17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Rotaviren >	G1 ^a	G2	(G3)										
Tetanus >		G1	G2	G3	G4	N	>	A1	A2		N	A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie >		G1	G2	G3	G4	N	>	A1	A2		N	A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis) >		G1	G2	G3	G4	N	>	A1	A2		N	A ^d	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b) >		G1	G2	G3	G4	N	>						
Kinderlähmung (Poliomyelitis) >		G1	G2	G3	G4	N	>		A		N	ggf. N	>
Hepatitis B >		G1	G2	G3	G4	N	>						
Pneumokokken >		G1 ^b		G2	G3	N							S ^f
Meningokokken C >					G (ab 12 Monaten)		N	>					
Masern >					G1	G2	N	>				S ^e	
Mumps >					G1	G2	N	>					
Röteln >					G1	G2	N	>					
Windpocken (Varizellen) >					G1	G2	N	>					
HPV (Humane Papillomviren) >									G1+G2 ^c	N ^c	>		
Gürtelrose (Herpes zoster) >													G1+G2 ^h
Grippe (Influenza) >													S (jährlich)
Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere													S (jährlich)

U

Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder

J

Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche

G

Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1–G4)

N

Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)

S

Standardimpfung

A

Auffrischimpfung

^a die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

^b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

^c 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 - 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter > 14 Jahre sind 3 Impfungen erforderlich

^d einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis

^e Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit

^f Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff

^h Zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten.