

**Вакцинация должна быть проведена как можно раньше.**

Целесообразно проверять статус вакцинации в любом возрасте. Пропущенные прививки необходимо немедленно восполнить согласно рекомендациям для соответствующего возраста.

**Рекомендации постоянной комиссии по вакцинации (STIKO), 2022. www.stiko.de**



ВАКЦИНАЦИЯ ВОЗРАСТ

	в неделях:			в месяцах							в годах											
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	с 18	с 60				
	U4			U5			U6			U7		U7a/U8		U9		U10		U11/11		J2		
Ротавирусы	G1 <sup>a</sup>			G2	(G3)																	
Столбняк <sup>b</sup>	G1			N	G2	N	G3 <sup>c</sup>		N			A1	N	A2		N	A <sup>e</sup>					
Дифтерия <sup>b</sup>	G1			N	G2	N	G3 <sup>c</sup>		N			A1	N	A2		N	A <sup>e</sup>					
Судорожный кашель <sup>b</sup> Коклюш	G1			N	G2	N	G3 <sup>c</sup>		N			A1	N	A2		N	A3 <sup>e</sup>		N			
Гемофильная инфекция <sup>b</sup> инфекция <i>Тип b</i>	G1			N	G2	N	G3 <sup>c</sup>		N													
Детский паралич <sup>b</sup> Полиомиелит	G1			N	G2	N	G3 <sup>c</sup>		N			A1		N								
Гепатит В <sup>b</sup>	G1			N	G2	N	G3 <sup>c</sup>		N													
Пневмококк <sup>b</sup>	G1			N	G2	N	G3 <sup>c</sup>		N			S <sup>g</sup>										
Менингококк С							G1		N													
Корь							G1		N	G2		N					S <sup>f</sup>					
Свинка, краснуха							G1		N	G2		N										
Ветрянка Ветряная оспа							G1		N	G2		N										
ВПЧ Вирус папилломы человека											G1 <sup>d</sup> G2 <sup>d</sup>		N									
Опоясывающий герпес																		G1 <sup>h</sup> G2 <sup>h</sup>				
Грипп Инflюэнца																		S (ежегодно)				

Сроки следующей вакцинации



**ПОЯСНЕНИЯ**

- G** БАЗОВАЯ ИММУНИЗАЦИЯ (до 3-х частичных прививок G1 - G3)
- S** СТАНДАРТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
- A** РЕВАКЦИНАЦИЯ
- N** ПОСЛЕДУЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ (Базовая иммунизация всех еще не вакцинированных или Завершение неполной серии вакцинаций)
- U** Скрининговое обследование
- J** Обследование подростков (J1 в возрасте 12–14 лет)

- a** Первая доза вакцины с 6-недельного возраста, в зависимости от используемой вакцины, 2-ая или 3-я доза вакцины с интервалом не менее 4 недель.
- b** Недоношенные дети: дополнительная доза вакцины в возрасте 3 месяцев, т. е. всего 4 дозы вакцины.
- c** Минимальный интервал от предыдущей дозы: 6 месяцев.
- d** Две дозы вакцины с интервалом не менее 5 месяцев, с дополнительной вакцинацией, начиная с возраста от 15 лет или с интервалом между вакцинациями менее 5 месяцев между 1-ой и 2-ой дозами Требуется 3-я доза.
- e** Ревакцинация Td (против столбняка и дифтерии) каждые 10 лет. Следующая обязательная вакцинация Td - однократная вакцинация как Tdap (против столбняка, дифтерии, коклюша) или, при наличии показаний, комбинированная вакцинация Tdap-IPV (против столбняка, дифтерии, коклюша и полиомиелита).

- f** Одноразовая вакцинация вакциной MMR (против кори, свинки, краснухи) для всех лиц, родившихся после 1970 г. ≥ 18 лет с неясным прививочным статусом, без вакцинации или только с одной прививкой в детстве.
  - g** Вакцинация 23-валентной полисахаридной вакциной.
  - h** Двухразовая вакцинация адьювантной вакциной против опоясывающего герпеса (инактивированной вакциной) с интервалом от 2 до 6 месяцев.
- \* Вакцинацию можно делать в несколько приемов. MMR (против кори, свинки, краснухи) и V можно назначать в один день или с интервалом в 4 недели.