

Tabelle 1 | Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2022

Impfung	Alter in Wochen						Alter in Monaten							Alter in Jahren										
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	U4	U5	U6	U7	U7a/U8	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60	
Rotaviren	G1 ^a	G2	(G3)																					
Tetanus ^b		G1		G2	G3 ^c											A1	A2		A2				A ^e	
Diphtherie ^b		G1		G2	G3 ^c											A1	A2		A2				A ^e	
Pertussis ^b		G1		G2	G3 ^c											A1	A2		A2			A3 ^e		
Hib ^b – <i>H. influenzae</i> Typ b		G1		G2	G3 ^c																			
Poliomyelitis ^b		G1		G2	G3 ^c														A1					
Hepatitis B ^b		G1		G2	G3 ^c																			
Pneumokokken ^b		G1		G2	G3 ^c																			S ^g
Meningokokken C							G1																	
Masern					G1		G1		G2														S ^f	
Mumps, Röteln					G1		G1		G2															
Varizellen					G1		G1		G2															
HPV – Humane Papillomviren																		G1 ^d	G2 ^d				G1 ^h	G2 ^h
Herpes zoster																								S (jährlich)
Influenza																								

- a** Empfohlener Impfzeitpunkt
 - b** Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
 - c** Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen
 - d** Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate
 - e** 2 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich
 - f** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
 - g** Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
 - h** Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff
 - i** Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
 - j** Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden
 - *** Standardimpfung
- Erläuterungen**
- G Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)
 - A Auffrischimpfung
 - S Standardimpfung