



Empfehlung nach STIKO (ständige Impfkommision)

- 2 Monate: **U4** & 1. 6-Fach-Impfung, 1. Pneumokokkenimpf., 1. Rotavirus-Schluckimpf.
- 2-3 Monate: 1. Meningokokken Typ B (*wird von den Kassen erstattet*)
- 3 Monate: 2. Rotavirus-Schluckimpfung (*frühestens 4 Wochen nach 1. Impf.*)
- 4 Monate: 2. 6-Fach-Impfung & 2. Pneumokokkenimpfung
(*frühestens 2 Monate nach der 1. Impfung*)
- 4-5 Monate: 2. Meningokokken Typ B (*frühestens 2 Monate nach der 1. Impf.*)
- 6 Monate: **U5**
- 12 Monate: **U6** & 3. 6-Fach-Impfung, 3. Pneumokokkenimpfung
(*frühestens 6 Monate nach der 2. Impf.*)
- 13 Monate: 1. Masern-Mumps-Röteln-Impf. & 1. Varizellen-Impfung
- 14 Monate: Meningokokken Typ C Impf. oder ACWY & ggf. 3. Meingokokken Typ B
- 15 Monate: 2. MMRV-Impfung
- 16 Monate: letzte Meningokokken Typ B (*frühestens 6 Monate nach der 2. Impf.*)
- 2 Jahre: **U7** (*etwa zum 2. Geburtstag*)
- 3 Jahre: **U7A** (*etwa zum 3. Geburtstag*)
- 4 Jahre: **U8** (*etwa zum 4. Geburtstag*)
- 5 Jahre: **U9** (*etwa zum 5. Geburtstag*)
- 6 Jahre: Impfung: Auffrischung Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten (*mit 5 J. Abstand*)
- 7-8 Jahre: **U10**
- ab 9 Jahren: Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs (*HPV*)
- 9-10 Jahre: **U11**
- 11 Jahren: Impfung: Auffrischung Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Polio
- 12 – 15 Jahre: **J1** (*etwa mit Beginn der Pubertät*)
- 16 – 17 Jahre: **J2**

Alle 7-10 Jahre: Auffrischung Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten

Bei Gefährdung: Grippe 1x/Jahr, FSME, Reiseimpfungen je nach Beratung

Bei Frühgeborenen 3+1 Schema: (je mit 2, 3 und 4 Monaten, 4. Impfung im 2. Lebensjahr)

6-Fach-Impfung, Pneumokokkenimpfung, Meningokokken B Impfung



Information zur Impfung gegen Meningokokken vom Typ B

Liebe Eltern,

in den Informationsmaterialien zu den Impfungen haben Sie von uns auch eine Information zur Impfung gegen Meningokokken vom Typ B erhalten.

Die Meningokokken B Meningitis ist eine seltene Erkrankung, die bei Säuglingen und Jugendlichen auftreten kann.

Hierbei handelt es sich um eine Impfempfehlung, die seit Januar 2024 von der STIKO empfohlen wird.

Die Impfung ist noch eine Privatleistung, wird aber von den meisten Krankenkassen auf Anfrage erstattet. Eine direkte Abrechnung mit den Kassen ist noch nicht möglich.

Sollten Sie sich für eine Impfung gegen Meningokokken vom Typ B entscheiden, gilt folgendes Impfschema:

Bei einer Impfung vor dem Alter von 2-23 Monaten werden insgesamt 3 Impfungen (sog. 2+1 Schema) benötigt:

- Zweimal im Abstand von 2 Monaten
- Einmalige Auffrischung dann im Alter von 12-15 Monaten

Falls Sie Geschwisterkinder impfen möchten, die bereits 2 Jahre oder älter sind, benötigt Ihr Kind 2 Impfdosen mit einem Abstand von 1 Monat.

Bei Rückfragen sprechen Sie bitte unser Praxisteam an!

Dr. med. Silvija Jerkic

Dr. med. Christian Walter