



Empfehlung nach STIKO (ständige Impfkommision)

- 2 Monate: **U4** & 1. 6-Fach-Impfung, 1. Pneumokokkenimpf., 1. Rotavirus-Schluckimpf.,
1. Meningokokken Typ B Impfung
- 3 Monate: 2. Rotavirus-Schluckimpfung (*frühestens 4 Wochen nach 1. Impf.*)
- 4 Monate: 2. 6-Fach-Impfung, 2. Pneumokokkenimpfung, 2. Meningokokken Typ B
(*frühestens 2 Monate nach der 1. Impf.*)
- 6 Monate: **U5**
- 12 Monate: **U6** & 3. 6-Fach-Impfung, 3. Pneumokokkenimpfung
(*frühestens 6 Monate nach der 2. Impf.*)
- 13 Monate: 1. Masern-Mumps-Röteln-Impf. & 1. Varizellen-Impfung
- 14 Monate: Meningokokken Typ C Impf. oder ACWY & 3. Meingokokken Typ B
(*frühestens 6 Monate nach der 2. Impf.*)
- 15 Monate: 2. MMRV-Impfung
- 2 Jahre: **U7** (*etwa zum 2. Geburtstag*)
- 3 Jahre: **U7A** (*etwa zum 3. Geburtstag*)
- 4 Jahre **U8** (*etwa zum 4. Geburtstag*)
- 5 Jahre **U9** (*etwa zum 5. Geburtstag*)
- 6 Jahre: Impfung: Auffrischung Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten (*mit 5 J. Abstand*)
- 7-8 Jahre: **U10**
- ab 9 Jahren: Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs (*HPV*)
- 9-10 Jahre: **U11**
- 11 Jahren: Impfung: Auffrischung Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Polio
- 12 – 15 Jahre: **J1** (*etwa mit Beginn der Pubertät*)
- 16 – 17 Jahre: **J2**

Alle 7-10 Jahre: Auffrischung Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten

Bei Gefährdung: Grippe 1x/Jahr, FSME, Reiseimpfungen je nach Beratung

Bei Frühgeborenen 3+1 Schema: (je mit 2, 3 und 4 Monaten, 4. Impfung im 2. Lebensjahr)
6-Fach-Impfung, Pneumokokkenimpfung, Meningokokken B Impfung